


# WASSERSCHUTZ: EMPFOHLENE STRATEGIEN

## Die vier Chloracetamide rotieren lassen

Ein Wechsel dieser Bodenherbizide in Mais reduziert vorbeugend mögliche Wirkstoffeinträge ins Grundwasser.



oder chloracetamidfreie Alternativen:

### Behandlungsfolgen, zum Beispiel:

- Triketone (+ Terbutylazin), Gräsersulfonyle\*
- Spectrum Plus + Triketone, Gräsersulfonyle\*
- MaisTer Power (Vorsicht Resistenz), Triketone
- Zingis, Triketone, Gräsersulfonyle\*
- Adengo, Nachlage


#### \* Beispiele für Gräsersulfonyle:

Motivell forte <sup>1)</sup>	0,4–0,75
Samson 4 SC <sup>2)</sup>	0,5–1,0
Nicogan <sup>1)</sup>	0,5–1,0
Cato/Escep	0,015–0,03
Principal <sup>1)</sup>	0,05–0,06

Angaben in l/ha oder kg/ha; <sup>1)</sup>nur alle zwei Jahre auf derselben Fläche; Angaben ohne Gewähr, Gebrauchsanweisung beachten; Stand: 2/2021; Quelle: Kuhlmann, LWK Niedersachsen

## Striegel, Hacke und Chemie kombinieren

gegen Hirsearten, Nachtschatten, Knöterich etc.



Quelle: Kuhlmann, LWK Niedersachsen