

Krautfäule der Kartoffel

Stand der Berechnungen: 8. Juni
Empfehlung für die Erstbehandlung nach dem Modell Simphyt und dem Krautfäule-Monitoring

Gefährdungseinstufung:
 geringe Krautfäulegefahr = mit 1. Behandlung kann noch gewartet werden
 mittlere Krautfäulegefahr = Bestände intensiv kontrollieren
 hohe Krautfäulegefahr = Behandlung wird empfohlen
Ja Krautfäule bereits in der Region gefunden
Nein bisher keine Krautfäule festgestellt
Gefährdungsgruppe 1: anfällige Sorten, Staunässe, Feuchteinfluss durch Gewässer, Phytophthora in benachbarten Schlägen
Gefährdungsgruppe 2: alle anderen Schläge

Wetterstation Standort (Lks.)	Kraut-fäule in der Region	Gefähr-dungs-gruppe	Auflauftermin				
			21.-30. April	1.-10. Mai	11.-20. Mai	21.-31. Mai	1.-10. Juni
Markersreuth HO	Nein	1					
		2					
Euerhausen WÜ	Nein	1					
		2					
Obersteinbach RH	Nein	1					
		2					
Vohenstrauß NEW	Nein	1					
		2					
Köfering R	Nein	1					
		2					
Wallerstein DON	Nein	1					
		2					
Hepberg EI	Nein	1					
		2					
Burgheim ND	Nein	1					
		2					
Baumannshof PAF	Nein	1					
		2					
Karlshuld ND	Nein	1					
		2					
Ainertshofen AIC	Nein	1					
		2					
Puch FFB	Nein	1					
		2					
Piering SR	Nein	1					
		2					
Uttenkofen DEG	Nein	1					
		2					
Neusling DEG	Nein	1					
		2					
Grub EBE	Nein	1					
		2					