

Reifemonitoring Silomais		Stand der TS-Messung: 27. August				
		Die Werte geben den Trockensubstanzgehalt der jeweiligen Sorte in Prozent an.				
Monitoringstandort	Saat am	KWS Johaninio S 210	Leguan S 230	ES Bond S 240	ES Palladium S 250	P 8888 S 280
Traunreut/TS	10.5.	22,5	21,9	22,1	21,2	20,3
Landsberg/LL	11.5.	19,2	20,0	20,8	17,1	19,0
Utting/LL	26.4.	20,0	22,0	20,5	20,1	18,6
Günzburg/GZ	27.4.	19,1	20,7	21,2	18,9	17,8
Puch/FFB	26.4.	20,4	22,3	21,4	20,0	20,1
Strass/ND	29.4.	18,3	21,3	20,9	18,7	18,8
Buchdorf/DR	23.4.	20,0	21,5	21,0	19,5	18,9
Fraunberg/ED	19.4.	22,3	24,3	23,0	21,6	20,6
Regenstauf/R	26.4.	25,7	24,7	23,6	23,2	22,8
Steinach/SR	21.4.	25,8	27,2	26,3	24,8	23,2
Rotthalmünster/PA	27.4.	24,4	26,5	25,2	23,0	21,8
Ruhstorf a.d. Rott/PA	27.4.	28,4	28,3	28,8	24,8	25,2
Almesbach/WEI	30.4.	21,4	21,7	20,6	20,7	19,9
Schwarzenau/KT	20.4.	25,8	26,1	26,0	21,6	23,1
Bayreuth/BT	11.5.	23,3	23,3	24,2	23,3	21,7
Merkendorf/AN	3.5.	20,8	22,9	22,4	21,1	19,9
Mittelwerte		22,3	23,4	23,0	21,2	20,7