Präparate im Rapsbau 2022									
Präparat	Wirkstoff	Wirkstoff- gehalt g/kg bzw. l	Aufwands- menge l bzw. kg/ha	Wachstums- reglereffekt ²	Phoma	Sklerotinia	Alternaria	Abstand zu Gewässern/ Hecken	Hang- neigungs- auflage > 2 % ³
Amistar Gold	Azoxystrobin Difenoconazol	125 + 125	1,0	☉	●			5(5/*/*)	0 m 5 m (Herbst)
Aziza	Azoxystrobin Isopyrazam	200 + 125	1,0		●			5(5/5/*)	0 m
Cantus Gold	Boscalid + Dimoxystrobin	200 + 200	0,5	☉	●	☉		5(5/*/*)	0 m 10 m (Herbst)
Caramba	Metconazol	60	1,5	☉	☉	☉		5(5/5/*)	0 m
Carax	Metconazol + Mepiquatchlorid	30 + 210	1,4	●	☉			5(*/*/*)	0 m
Custodia	Azoxystrobin + Tebuconazol	120 + 200	1,0			●		5(5/*/*)	0 m
Efilor	Metconazol + Boscalid	60 + 133	1,0	☉	☉	●	☉	5(5/*/*)	0 m
Folicur	Tebuconazol	250	1,0 – 1,5	☉	☉	☉	☉	15(10/5/5) NT101 1)	10 m
Helocur	Tebuconazol	250	1,0 – 1,5		☉			10(5/5/*)	10 m
Intuity ⁴⁾	Mandestrobin	250	0,8			☉		5(5/*/*)	0 m
Orius	Tebuconazol	200	1,5	☉	☉	☉		10(5/5/*)	10 m
Ortiva ⁴⁾	Azoxystrobin	250	1,0			☉	☉	5(*/*/*)	0 m
Azbano/Chamane/ Torero ⁴⁾	Azoxystrobin	250	1,0			☉	☉	5(5/*/*)	0 m
Propulse	Fluopyram + Prothioconazol	125 + 125	1,0			●	☉	5(*/*/*)	0 m
Tilmor	Prothioconazol + Tebuconazol	80 + 160	1,2	☉	☉			10(5/5/*)	10 m
Toprex	Difenoconazol + Paclobutrazol	250 + 125	0,35 – 0,5	☉	☉			5(5/*/*)	0 m
Treso	Fludioxonil	500	0,75			●		5(5/*/*)	0 m
Zenby Flex	Isofentamid + Prothioconazol	400 + 300	0,4 + 0,4			●	☉	5(5/5/*)	0 m

☉ = keine Wirkung; ☉ = geringe Wirkung; ☉ = mittlere Wirkung; ☉ = gute Wirkung; ● = sehr gute Wirkung; ¹ In Gemeinden mit ausreichendem Anteil an Kleinstrukturen keine Einschränkung zu „Nichtzielflächen“; ² Aufwandmenge abhängig von Anbauregion und Witterung. Längere Trockenheit und hohe Temperaturen nach der Anwendung kann das Pflanzenwachstum unerwünscht beeinträchtigen; ³ Bei > 2 % Hangneigung ist zu Gewässern ein Randstreifen mit geschlossener Pflanzendecke erforderlich außer bei Mulch/Direktsaat. Bei Amistar Gold und Cantus Gold nur bei Herbstbehandlungen; ⁴ eingeschränkte Wirksamkeit möglich