

N_{min}-Werte für Sommerungen in kg N/ha

Hauptfrucht	Oberbayern		Niederbayern		Oberpfalz		Oberfranken		Mittelfranken		Unterfranken		Schwaben	
	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig
Kulturen mit tiefer (0-90 cm) Durchwurzelung des Bodens														
S-Weizen, Durum, S-Roggen, S-Raps	62	54	53	48	54	52	61	55	59	54	58	57	62	57
Z-Rüben, F-Rüben	63	56	59	57	58	55	66	62	70	59	57	58	64	61
Silomais, Körnermais	66		72		52		59		60		57		61	
Sonstige Fruchtarten	62	54	61	55	59	55	61	55	58	54	61	58	65	58
Kulturen mit mittlerer (0-60 cm) Durchwurzelung des Bodens														
S-Gerste, Hafer	44	40	40	38	40	41	45	41	42	44	42	42	47	42
Sonnenblumen, Lein	42	41	37	37	42	42	47	40	36	39	41	41	50	45
Kartoffeln	39		44		47		36		36		49		48	
Sonstige Fruchtarten	46	40	45	41	44	41	45	41	43	40	45	43	48	43