

## Tabelle 2: Herbizide gegen Unkräuter und Ungräser im Sommergetreide

Präparat	Wirkstoff Wirkstoff- konzentration (g/l bzw. kg)	HRAC- Wirk- gruppe***	Aufwand- menge/ha	Kosten €/ha *	Zulassung in **						Einsatz- termin (BBCH)	Indikation Zielpflanzen	Hinweis
					SW	SG	SH	SD	SR	ST			
Axial 50	Pinoxaden 50	1	0,9 l / 1,2 l	40 / 54	●	●		●			13 - 39	Gemeiner Windhalm, Flughafer / Ackerfuchs- schwanz, Weidelgras	reine Ungraswirkung, Mischbarkeitshinweise und Resistenzrisiko beachten!
Axial Komplett	Pinoxaden 45 + Florasulam 5	1 + 2	1,0 l	42	●	●		●			13 - 29	Windhalm, Flughafer und zweikeimblättrige Unkräuter	entspricht 0,9 l/ha Axial 50 + 0,1 l/ ha Primus.
Broadway	Pyroxsulam 68 + Florasulam 23	2	130 g + 0,6 l / 220 g + 1,0 l	38 - 64				●			12 - 32	Windhalm und Unkräuter / Ackerfuchsschwanz, Wei- delgräser und Unkräuter	breit wirksam, häufig keine weitere Ergänzung gegen Unkräuter nötig
Husar Plus + Mero	Iodosulfuron 50 + Mesosulfuron 7,5	2	150 ml + 0,75 l	30	●	●		●			13 - 30	Flughafer, Windhalm, einjährige zweikeimblättri- ge Unkräuter	Nebenwirkung gegen Weidelgras und Jährige Risse, Resistenzrisiko beachten

\* Preise nach Handelsliste für Großgebände, ohne Mehrwertsteuer; \*\* SW = Sommerweizen, SG = Sommergerste, SH = Sommerhafer, SD = Durum bzw. Sommerhartweizen, SR = Sommerroggen, ST = Sommertriticale; \*\*\* Gleiche Zahl = gleicher Wirkmechanismus = gleichartiges Resistenzrisiko; BBCH-Stadium = Entwicklungsstadium, z.B. 13 = 3. Blatt, 29 = Bestockungsende; Bindend für die Anwendung ist die Gebrauchsanleitung der Präparate!