

# Speziallösungen gegen Problemunkräuter

Unkräuter	Präparat(e)	Aufwand je ha	Einsatz	Kosten <sup>1</sup>	Bemerkung
Altverunkrautung auf Direkt- und Mulchsaatflächen	Kyleo	5,0 l	VS	81	Zur nicht selektiven Unkrautregulierung v.a. auf Direktsaatflächen. Bei Mulchsaat Bodenbearbeitung nach 10-14 Tage Einwirkzeit (VS). Bei Direktsaat bis 2 Tage vor der Saat (VS) bzw. bis 5 Tage nach der Saat (NS). Keine Dauerwirkung! Einsatz auf das absolut notwendige Mass beschränken!
	Durano TF u.a.	3,0 l	VS	43	
	Roundup Rekord	1,6 kg	VS / NS	48	
	Roundup PowerFlex	2,25 - 3,75 l	VS / NS	47 - 79	
Quecke	Arigo	300 g + 0,3 l FHS	NA 12 - 18	57	Nach dem Auflaufen der Quecke mit mindestens 2-4 Blättern und maximal 15 cm Wuchshöhe. Unterdrückende Wirkung. Focus Ultra nur in Cycloxydim-resistenten DUO-Mais einsetzbar!
	Cato	50 g + 0,3 l FHS	NA 12 - 16	51	
	MaisTer power	1,5 l	NA 12 - 16	67	
	Focus Ultra + Dash	2,0 + 2,0 l	NA 12 - 18	62	
Schönmalve, Lichtnelke, Stechapfel, Ambrosia, Ziest, Rauken, Zweizahn, Ackerwinde, Disteln, Land-Wasser-Knöterich	Arrat + Dash	0,2 kg + 1,0 l	NA 14 - 16	27	Einsatz bei wüchsigem Wetter bei ausreichender Blattmasse der Zielunkräuter. Gegenseitige Blattabschirmung der Unkräuter oder durch den Mais vermeiden. Bei Wurzelunkräutern unterdrückende Wirkung.
Durchwuchskartoffeln, Acker-Schachtelhalm	Daneva	2 x 0,75 l	NA 12 - 18	40	Rein blattaktive Behandlung mit Kontaktwirkung (Blattverätzung) bei 10-15 cm Wuchshöhe der Unkräuter.
Ambrosia, Stechapfel, Schönmalve, Distel und Kartoffeldurchwuchs	Laudis	2,25 l	NA 12 - 18	72	Nach dem Auflaufen bei 10 bis 20 cm Wuchshöhe der Unkräuter. Bei Spätbehandlungen Einsatz mit abgehängten Düsen sinnvoll. Kein Einsatz in Saat- und Zuckermais.
Ampfer-Arten und Sonnenblumen	Harmony SX oder Lupus SX Mais + Trend (FHS)	15 g + 0,1 %	NA 14 - 16	18	Einsatz bei wüchsigem Wetter mit milden Temperaturen (10 - 20 °C). Auf Sortenempfindlichkeit und ausreichende Wachsschicht achten. Keine Dauerwirkung! 20 g/ha Peak besitzen auf Ampfer ebenfalls eine hohe Wirksamkeit!
Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel	Effigo	0,35 l	NA	48	Behandlung bei 15-25 cm Wuchshöhe der Distel-Arten, in der Regel als Teilflächenbehandlung. Wüchsiges Wetter fördert die Wirkung. Ambrosia, Ausfall-Sonnenblumen und Durchwuchskartoffeln werden mit erfasst. Nachbau von Leguminosen ist nicht möglich.
	Lontrel 600	0,2 l		52	
	Lontrel 720 SG	0,16 kg		50	
	Vivendi	1,2 l		50	
Acker-Winde, Zaun-Winde, Gänsefuß und Winden-Knöterich	Mais-Banvel WG u.a.	0,4 - 0,5 kg	NA 14 - 16	27 - 34	Behandlung ab 20 cm Trieblänge der Winden bei warmem, wüchsigem Wetter. Auf leichten Böden und kleinen Unkräutern 0,4 kg ausreichend. Bei Spätbehandlungen Einsatz mit abgehängten Düsen sinnvoll.

<sup>1</sup> Kosten in €/ha nach Handelsliste für Großgebäude ohne MwSt., VS = Vorsaatbehandlung; NS = bis 5 Tage nach der Saat; VA = Vorauflaufbehandlung; NA = Nachauflaufbehandlung