

# Krautfäule der Kartoffel

**Stand der Berechnungen: 14. Juni**  
 Empfehlung für die Erstbehandlung nach dem Modell Simphyt und dem Krautfäule-Monitoring

## Gefährdungseinstufung:

geringe Krautfäulegefahr = mit 1. Behandlung kann noch gewartet werden

mittlere Krautfäulegefahr = Bestände intensiv kontrollieren

hohe Krautfäulegefahr = Behandlung wird empfohlen

Ja Krautfäule bereits in der Region gefunden

Nein bisher keine Krautfäule festgestellt

Gefährdungsgruppe 1: anfällige Sorten, Staunässe, Feuchteinfluss durch Gewässer, Phytophthora in benachbarten Schlägen

Gefährdungsgruppe 2: alle anderen Schläge

Wetterstation Standort (Lks.)	Krautfäule in der Region	Gefährdungsgruppe	Auflauftermin				
			21.-30. April	1.-10. Mai	11.-20. Mai	21.-31. Mai	1.-10. Juni
Poppenholz HO	Nein	1					
		2					
Euerhausen WÜ	Nein	1					
		2					
Obersteinbach RH	Nein	1					
		2					
Vohenstrauß NEW	Nein	1					
		2					
Köfering R	Nein	1					
		2					
Wallerstein DON	Nein	1					
		2					
Langensallach EI	Nein	1					
		2					
Burgheim ND	Nein	1					
		2					
Baumannshof PAF	Nein	1					
		2					
Karlshuld ND	Nein	1					
		2					
Ainertshofen AIC	Nein	1					
		2					
Puch FFB	Ja	1					
		2					
Piering SR	Nein	1					
		2					
Uttenkofen DEG	Ja	1					
		2					
Neusling DEG	Ja	1					
		2					
Grub EBE	Ja	1					
		2					

Beteiligte am Monitoring: ÄELF mit FZ L 3.1: Ansbach, Augsburg, Bayreuth, Deggendorf, Regensburg, Rosenheim, Würzburg