

# Krautfäule der Kartoffel

## Empfehlung für die Erstbehandlung nach dem Modell SIMPHYT und dem Krautfäule-Monitoring

■ geringe Krautfäulegefahr – mit der ersten Behandlung kann noch abgewartet werden

■ mittlere Krautfäulegefahr – Bestände intensiv kontrollieren

■ hohe Krautfäulegefahr – Behandlung wird empfohlen

Gefährdungsgruppe 1: anfällige Sorten, Staunässe, Feuchteinfluss durch Gewässer, Phytophthora in benachbarten Schlägen

Gefährdungsgruppe 2: alle anderen Schläge

Stand der Berechnungen:  
28.5.2024

### Wetterstation

Landkreis	Standort	Krautfäule in der Region	Gefährdungsgruppe	Auflauftermin 21.-30. April	Auflauftermin 1.-10. Mai	Auflauftermin 11.-20. Mai	Auflauftermin 21.-31. Mai	Auflauftermin 01.-10. Juni
HO	Münchberg	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
BA	Wiesengiech	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
WÜ	Euerhausen	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
FÜ	Greimersdorf	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
RH	Obersteinbach	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
NEW	Almesbach	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
R	Köfering	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
SR	Piering	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
DEG	Uttenkofen	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
DEG	Neusling	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
EI	Langensallach	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
DON	Wallerstein	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
DLG	Frauenriedhausen	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
ND	Burgheim	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
ND	Karlshuld	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
PAF	Baumannshof	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
AIC	Ainertshofen	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
FFB	Puch	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
ED	Eichenried	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					
EBE	Grub	Nein	1	■	■	■	■	■
			2					