

Mehrjährige Ackergrasmischungen für den Anbau ab August bis Mitte September

Quelle: „Qualitätsstandardmischungen für den Ackerfutterbau 2019/20“

Ackergrasmischungen

Standardmischung für den Ackerbau	A 1*	A 1 WZ*	A 3	A 5**	A 5 spät**
Nutzungsdauer	1 Hauptnutzungsjahr	Winterzwischenfrucht	2 Hauptnutzungsjahre	2 Hauptnutzungsjahre und mehr	
Nutzungsformen	Schnitt und Weide	Schnitt	Schnitt und Weide	Schnitt und Weide	
Aussaart	Mitte September Blanksaat	Blanksaat	August Blanksaat oder Frühjahr unter Deckfrucht	August Blanksaat oder Frühjahr unter Deckfrucht	
	%	%	%	%	%
Welsches Weidelgras	100*	100*	29		
Bastardweidelgras			29		
Deutsches Weidelgras			42		
früh				30	
mittelfrüh				40	50
spät				30	50
Saatstärke bei Blanksaat: kg/ha***	40	40	35	30**	30**
Saatstärke bei Untersaat: kg/ha***			25	20	20

* = mindestens 3 Sorten für die A1 und 2 Sorten für die A1 WZ. Bei Verzicht auf N-Düngung kann zur Mischung A 1 Rotklee gegeben werden (20 kg/ha A 1 + 10 kg/ha Rotklee)

** = Zur Steigerung der Energiekonzentration und Nutzungselastizität kann zu den Mischungen A5 und A5 spät auch 2 kg/ha Weißklee zugemischt werden.

*** = Je nach Anteil tetraploider Sorten kann die Aussaatstärke um bis zu 30 % erhöht werden