

# Rotation der Chloracetamide (Beispiele seit 2022)

| 1. Anbaujahr                         | 2. Anbaujahr                          | 3. Anbaujahr                      | 4. Anbaujahr                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Pethoxamid                           | Dimethenamid-P                        | S-Metolachlor                     | Chloracetamid frei                              |
| Motivell Komplett Pack <sup>1</sup>  | Arigo Spectrum Plus Pack <sup>2</sup> | Elumis P Dual Pack <sup>2</sup>   | Adengo + Laudis <sup>2</sup> (Behandlungsfolge) |
| Principal S Pack <sup>1</sup>        | Spectrum Aqua Pack <sup>2*</sup>      | Callisto P Dual Pack <sup>2</sup> | Arrat + Elumis Pack <sup>2</sup>                |
| Successor Top 3.0 Pack <sup>1*</sup> |                                       |                                   | Callisto P Pack <sup>2</sup>                    |
| Elumis Triumph Pack <sup>1</sup>     |                                       |                                   | Elumis P Pack <sup>2</sup>                      |

<sup>1</sup> NG 362 für TBA; <sup>2</sup> TBA freie Herbizide; \*evtl.+ Gräsersulfonyle z.B.: Motivell forte\*\* 0,4-0,75 l/ha; Samson 4 SC\*\* 0,5-1,0 l/ha; Nicogan\*\* 0,5-1,0 l/ha; MaisTer fl. 0,75-1,2 l/ha; Cato/Escep 15-30 g/ha; Principal\*\* 50-60 g/ha; Ikanos 0,4-0,75 l/ha; \*\*Absicherung

## Achtung:

1. Bei Gräsersulfonylzusatz, z.B. gegen Borstenhirse, Rispe das Basisherbizid um 25 % reduzieren; Verträglichkeit beachten!
2. Nicosulfuronhaltige Herbizide dürfen nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche eingesetzt werden!
3. Spectrum Plus im VA keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG 405) beachten
4. Flufenacet kann im Mais auch eingesetzt werden, allerdings aus Gründen der Resistenzvermeidung sollte der Wirkstoff ausschließlich im Getreide verwendet werden.